


KANSERLİ HASTALARDA YAŞAM KALİTESİ

Hicran Yıldız**, Perihan Yücel*, Fatma Efe*,
Hatice Karabuğa*, Rukiye Pınar**

- * Marmara Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu,
İntern Grubu Öğrencileri
- ** Marmara Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu,
Öğretim Elemanları



- Kanserde hem **hastalığın kendisi** hem de **uygulanan tedavi yöntemleri** hastaların **yaşam kalitesini** önemli derecede etkilemektedir.



AMAÇ

- Bu çalışma kanserli hastaların yaşam kalitesi düzeylerinin ve bunu etkileyen faktörlerin belirlenmesi amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır.



YÖNTEM


Veriler;

- Genel bilgi formu
- Çok Boyutlu Yaşam Kalitesi Skalası
(Turkish version of the Multidimensional Quality of Life Scale - Cancer Version 2 -MQOLS-CA2-
aracılığı ile toplanmıştır.




BULGULAR

- Yaş ortalaması 45.77 ± 14.91 ve %55.8'i erkek, %44.2'si kadın olan olguların çoğunluğu evli ve orta derecede ekonomik duruma sahiptir.



Olgularda var olan kanser türleri arasında ilk üç sırada;

- akciğer kanseri (13.4),
- meme kanseri (9.3) ve
- lenfoma (7.6) yer almaktadır.




Olguların;

- %89.5'i kemoterapi,
- %57'si cerrahi tedavi ve
- %19.8'i radyoterapi almıştır.



Olguların;

- Ortalama yaşam kalitesi puanı 63.95 ± 2.24 'tür.
- En yüksek puan aldıkları yaşam kalitesi alanı **kişilerarası ilişki** (76.12 ± 8.93),
- En düşük puan aldıkları yaşam kalitesi alanı ise **psikolojik iyilik hali** (57.55 ± 1.87) alanıdır.




- Yaş arttıkça yaşam kalitesinin fiziksel iyilik hali boyut puanı azalmakta,
- Öğrenim durumu arttıkça psikolojik iyilik hali boyut puanı artmaktadır.



SONUÇ ve ÖNERİLER

- Kanserli hastalarda yaşam kalitesinin olumsuz yönde etkilenmektedir.
- Kanserli hastalarda yaşam kalitesini etkileneen sosyo-demografik faktörlerin derinlemesine incelenmesi önerilmiştir.



TEŞEKKÜRLER

