

MİYOKARD İNFARKTÜSÜ GEÇİREN HASTALARDA SEKSÜEL DİSFONKSİYONUN YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİ

Hicran Yıldız, Rukiye Pınar

**Marmara Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu,
İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı**



AMAÇ

- Bu çalışmada miyokard infarktüsü (MI) geçiren 102 hastada seksüel disfonksiyonun yaşam kalitesine etkisi incelenmiştir.




YÖNTEM

- Genel bilgi formu,
- Uluslararası cinsel fonksiyon değerlendirme formları;
 - Kadınlar için IFSF,
 - Erkekler için IIEF
- SF-36 Yaşam Kalitesi Ölçeği



BULGULAR

- ♥ MI sonrası olguların %53.9'unda cinsel ilişki sıklığında, %32.4'ünde cinsel ilişki tatmininde azalma olmuştur.
- ♥ MI sonrası cinsel ilişkiye giren kadınların %80'inde, erkeklerin %37'sinde cinsel disfonksiyon mevcuttur.




- ♥ Erektile disfonksiyon (ED) saptanan erkeklerin %65.2'sinde hafif, %21.2'sinde orta ve %13'ünde ağır derecede ED mevcuttur.
- ♥ Seksüel disfonksiyonu olan hastalarda olmayanlara göre sosyal fonksiyon hariç, tüm SF-36 alt boyut puanları düşüktür.



SONUÇ

- MI'lı hastalarda cinsel disfonksiyon yaygındır.
- Cinsel disfonksiyon sosyal fonksiyon hariç, yaşam kalitesinin tüm alt boyutlarını etkilemektedir.



TEŞEKKÜRLER

