



# Behçet Hastalarında Yaşam Kalitesinin Hastalık Aktivitesi İle İlişkisi

**Uzm.Dr.İlgen Ertam, Uzm.Dr.Gül Kitapçioğlu, Doç.Dr.Kenan Aksu,  
Prof.Dr.Hayriye Elbi Mete, Uzm.Yük.Hem.Äylin Özakсар,  
Prof.Dr.İdil Ünal, Prof.Dr.Sibel Alper**



# Amaç

- Behçet hastalarının ve sağlıklı kontrol grubunun yaşam kalitesi düzeylerini belirlemek
- Hastalık aktivitesinin yaşam kalitesi üzerindeki etkisini saptamak
- SF 36 ve WHOQOL<sub>100</sub> yaşam kalitesi ölçeklerinin Behçet hastalarında kullanılabilirliğini saptamak



- **Hastaların (n=195)**

- %50,7'si Erkek
- %49,2'u Kadın

- **Kontrol Grubunun (n=195)**

- %50,8'si Erkek
- %49,3'ü Kadın

- **195 hastanın %25.8'i aktif**


- % 19,4'ü Kadın
- % 31,7'si Erkek

- **Eğitim düzeyleri**

- Hasta Grubu % 67 lise
- Kontrol % 62 lise




# WHOQOL





# WHOQOL



	Bedensel Sağlık	Ruhsal Sağlık	Bağımsızlık düzeyi	Sosyal İlişkiler	Çevre	Sosyal Baskı (Ulusal alan)
◆ Kadın Behçet Hast	12,8	14,2	13,8	14,7	14,3	13,6
■ Erkek Behçet Hast	13,4	14,2	13,6	14,2	13,6	13,1
▲ Kadın Kontrol	15,5	15,6	16,7	15,2	13,9	13,1
● Erkek Kontrol	15,8	15,8	16,8	15,1	13,4	12,7

p	0,118	0,786	0,666	0,199	0,016	0,021
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------



# WHOQOL



p	0,000	0,000	0,000	0,010	0,207	0,017
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

		Bedensel Sağlık	Ruhsal Sağlık	Bağımsızlık düzeyi	Sosyal İlişkiler	Çevre	Sosyal Baskı (Ulusal alan)
Genel Sağlık	R	<b>0,749</b>	<b>0,628</b>	<b>0,743</b>	<b>0,392</b>	<b>0,197</b>	<b>0,127</b>
	p	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,014
	N	379	380	379	379	379	379
Algılanan Sağlık	R	<b>0,228</b>	<b>0,183</b>	<b>0,232</b>	<b>0,218</b>	<b>0,164</b>	<b>0,169</b>
	p	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001	0,001
	N	389	390	389	389	389	389
Fiziksel Fonksiyon	R	<b>0,626</b>	<b>0,488</b>	<b>0,670</b>	<b>0,296</b>	<b>0,148</b>	
	p	0,000	0,000	0,000	0,000	0,004	p>0,05
	N	372	373	372	372	372	
Fiziksel Kısıtlılıklar	R	<b>0,500</b>	<b>0,419</b>	<b>0,603</b>	<b>0,274</b>	<b>0,137</b>	
	p	0,000	0,000	0,000	0,000	0,009	p>0,05
	N	366	366	365	365	365	
Emosyonel Kısıtlılıklar	R	<b>0,536</b>	<b>0,517</b>	<b>0,570</b>	<b>0,355</b>	<b>0,176</b>	<b>0,104</b>
	p	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001	0,048
	N	360	361	360	360	360	360
Sosyal Fonksiyon	R	<b>0,649</b>	<b>0,553</b>	<b>0,634</b>	<b>0,346</b>	<b>0,177</b>	<b>0,107</b>
	p	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001	0,038
	N	378	378	377	377	377	377
Ağrı	R	<b>0,312</b>	<b>0,206</b>	<b>0,280</b>	<b>0,125</b>		
	p	0,000	0,000	0,000	0,014	p>0,05	p>0,05
	N	385	386	385	385		
Vitalite	R	<b>0,738</b>	<b>0,724</b>	<b>0,719</b>	<b>0,528</b>	<b>0,346</b>	<b>0,280</b>
	p	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	N	384	385	384	384	384	384
Mental Sağlık	R	<b>0,594</b>	<b>0,664</b>	<b>0,587</b>	<b>0,471</b>	<b>0,307</b>	<b>0,241</b>
	p	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	N	382	383	382	382	382	382



# Sonuç ve Öneriler

- Behçet Hastalarında yaşam kaliteleri her iki ölçek alt gruplarında anlamlı düşük
- Behçet Hastalarında bedensel sağlık algısı ruhsal sağlık algısına göre daha düşük bulundu
- Psikiyatrik değerlendirme önemli
- SF-36 ile araştırma daha fazla
- SF-36 ve WHOQOL-100 korele bulunmuş olup, WHOQOL-100 de Behçet Hastaları'nda kullanılabilir



Teşekkür ederim

